

**DERMATITA FACIALA IDIOPATICA LA PISICILE PERSANE
PREZENTARE DE CAZ**

V.ANDRONIE

Facultatea de Medicina Veterinara Spiru Haret

Istoric

- ▶ O pisica Persană, femelă, în vârstă de 3 ani, sterilizată a fost prezentată cu un istoric de 10 luni cu dermatita facială.
- ▶ Această pisică, vaccinată, a locuit într-o casă cu 4 alte pisici.
- ▶ Aceasta nu a avut alte antecedente sau probleme medicale, decât boala cronică a pielii.
- ▶ Simptomele pielii au apărut pentru prima dată în jurul vârstei de 20 luni, provocând leziuni faciale din ce în ce mai frecvente pe care în cele din urmă au devenit cronice, cu intermitente acutizări.
- ▶ Tratamentul local zilnic a fost necesar, fără de care pisica s-ar fi zgâriat intensiv, agravând și mai mult leziunile.

Istoric

- ▶ Corticosteroizii par să aibă efecte pozitive, dar tranzitorii.
- ▶ Testele FeLV / FIV recente au fost negative.
- ▶ Un test de sânge care cuprinde hematologie de rutină și biochimie nu au arătat anomalii, cu excepția numărului crescut al eozinofilelor.
- ▶ Toate animalele din casa au primit tratament contra puricilor iar mediul a fost tratat de două ori pe an.
- ▶ Examinare generală a fost satisfăcătoare. Proprietarul a indicat că, în timpul crizelor acute, comportamentul pisicii s-a schimbat și a avut tendința de a se izola. De asemenea, a subliniat că în aceste perioade, pisica a dezvoltat de multe ori conjunctivită severă, dar nici un semn respirator.

Examinare dermatologica



- ▶ Boala de piele a fost localizata doar pe fata și afectează pleoapele, falduri faciale și nazale, buze și bărbie.
- ▶ A fost semnalată conjunctivita

Examinare dermatologica



- ▶ Leziunile au fost puternic inflamatorii cu eritem prezent. Un număr mare de particule foliculare negricioase, aderente la firele de păr, s-au observat în toate aceste zone.

Diagnostic diferencial



- ▶ Dermatita alergica
- ▶ Dermatita asociata cu herpesvirus
- ▶ Dermatofitoza
- ▶ Infectie cu calicivirus
- ▶ Dermatita faciala idiopatica a Persanelor
- ▶ Piodermita, *Malassezia*, demodicoza

Diagnostic

- ▶ Testul cu scotch: neutrofile, eozinofile, coci si fara *Malassezia*.
- ▶ Testul de raclaj cutanat: negativ
- ▶ Examen cu lampa Wood: negativ
- ▶ Examen cultural pentru miceti: negativ
- ▶ Distributia si aspectul leziunilor corelata cu rezultatul testelor efectuate conduce catre:

”Dermatita faciala idiopatica a pisicilor Persane”

Tratament

- ▶ Marbofloxacină 2 mg/kg/zi pentru tratamentul infecțiilor secundare
- ▶ Dietă hipoalergenica
- ▶ Dexametazonă (Dexoral) 0,05 mg/kg/zi + doxiciclină 10 mg/kg/zi timp de 3 săptămâni
- ▶ Toaletă locală cu soluție de clorhexidină
- ▶ Rezultate slabe
- ▶ Ciclosporină 5 mg/kg/zi timp de 30 de zile cu rezultate vizibile după 10 zile
- ▶ Interferon 2 injecții subcutanate de 2 ori pe săptămână câte 5 milioane de unități, timp de 3 săptămâni, cu rezultate vizibile după a treia injecție și cu remitere aproape completă după cea de-a șasea

Tratament



Tratament



Concluzii

- ▶ Dermatita faciala idiopatica ,“dirty face syndrome” sau dermatita faciala seboreica este o afectiune descrisa recent care afecteaza pisicile din rasa Persana sau cele din rasa Hymalaia
- ▶ Leziunile par sa aibe origini genetice, care se dezvoltă progresiv la pisicile tinere si ca este vorba de o predispozitie
- ▶ Leziunile sunt periorbitare, faciale si pe barbii
- ▶ Diagnosticul diferential este foarte important
- ▶ Tratamentul cu ciclosporina si interferon ofera rezultate promitatoare dar exista posibilitatea recidivei