

UN CAZ DE LUPUS CUTANAT REFRACTAR LA TRATAMENT

Conf.univ.dr. Viorel Andronie-Universitatea “Spiru Haret” Bucuresti

ANAMNEZA-SEMNE CLINIE

- Un caine in varsta de 4 ani care prezinta de 3 luni leziuni cutanate
- A primit tratament timp de o luna pentru micoze cutanate si apoi doua prize scurte de corticoterapie. Ameliorare tranzitorie, dar nesemnificativa.
- Dermatita severa ulcero-crustoasa in jurul ochilor si pe trufa, medie la nivelul urechilor si preputului
- Nu prezinta prurit si nici modificari ale starii generale

SEMNE CLINICE



Eroziuni

Ulcere

Cruste

SEMNE CLINICE



Ulceratii ale pilierilor nazali

Cruste ale planului nazal

Eritem si depigmentari ale buzelor

SEMNE CLINICE



Eroziuni si cruste pe fata interna
a pavilionului urechii

SEMNE CLINICE



Eroziuni si cruste preputiale

DIAGNOSTIC

- Ipoteze de diagnostic:
 - Piodermita mucocutanata
 - Lupus cutanat
 - Pemfigoid bulos
 - Demodicoza
- Raclaj cutanat periocular si test prin aprenta
- Niciun element figurat nu a fost depistat
- Examen citologic:bacterii cocoide intracelular
- Examen histopatologic:
degenerescenta hidropica a celulelor bazale, infiltrat inflamator lichenoid dermic limfoplasmocitar, incontinenta pigmentara, keratinocite apoptice pe membrana bazala

TRATAMENT

- Corticoterapie: prednisolone 1,5 mg/kg/zi
- Antibioterapie: cephalexin 30 mg/kg/zi

TRATAMENT DUPA 2 SAPTAMANI



- Cicatrizarea pielii si vindecarea zonei mucocutanate periocularare
- Caderea crustelor de pe planul nazal
- Disparitia eritemului preputial
- Persistenta ulceratiilor la nivelul pilierilor nazali
- Diminuarea corticoterapiei la 1 mg/kg/zi timp de inca 2 saptamani

TRATAMENT DUPA 2 SAPTAMANI



TRATAMENT DUP 2 SAPTAMANI



TRATAMENT DUPA 1 LUNA SI DUPA 2 LUNI

- Ameliorare clinica semnificativa cu disparitia crustelor periocular, preputial si de pe trufa
- Pilierii nazali erodati
- Corticoterapia inca 2 saptamani si antibioterpie inca o saptamana
- Introducerea terapiei imunomodulatoare:doxiciclina si nicotinamida 6-8 saptamani
- Stare clinica stabilă
- Cateva cruste nazale
- Continuarea terapiei imunomodulatoare si aplicarea locala de clobetasol

TRATAMENT LA 3 LUNI SI LA 5 LUNI

- Starea clinica stabila
- Mantinerea tratamentului imunomodulator si local
- Recidiva severa perioculara, nazala si preputiala
- Prednisolon 1,5 mg/kg/zi timp de 2 saptamani si apoi 0,75 mg/kg/zi inca 2 saptamani
- Azatioprina 1,5 mg/kg/zi timp de 2 luni

TRATAMENT LA 6 LUNI SI LA 7 LUNI

- Leziunile sunt bine controlate
- Apare PU/PD si diaree
- Stoparea azatioprinei si reintroducerea terapiei imunomodulatoare pentru inca 6 saptamani
- Inlocuirea clobetasolului cu aceponat de hidrocortizon aplicat local 1-2 ori/zi timp de 20 de zile
- Proprietarul spune ca leziunile se agraveaza daca exista expunere solara.Evitarea expunerii solare intre orele 10-16

